

疾患名	レジメン名称	インターバル日数	薬剤名称	標準値(1回量)	単位	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5	Day 6	Day 7	Day 8	Day 9	Day 10	Day 11	Day 12	Day 13	Day 14	Day 15	Day 16	Day 17	Day 18	Day 19	Day 20	Day 21	Day 22
胚細胞腫瘍	VeIP療法	21	エトモド注 10mg	0.2	mg/Kg																						
			イホマイト注 1g	1	g/m ²																						
			ウズベキザン注〔シリン〕 400mg/4ml	240	mg/m ²																						
			シスプラチン点滴静注(10、25、50mg)	20	mg/m ²																						
			ウズベキザン注〔シリン〕 400mg/4ml	240	mg/m ²																						
胚細胞腫瘍	【胚細胞】TIP療法	21	シスプラチン点滴静注(10、25、50mg)	20	mg/m ²																						
			イホマイト注 1g	1	g/m ²																						
			ウズベキザン注〔シリン〕 400mg/4ml	333	mg/m ²																						
			(薬)ノリタセ点点滴静注液「ホステーラ」(30、100mg)	175	mg/m ²																						
			エトモド点点滴静注(100mg/サト) 5ml	100	mg/m ²																						
胚細胞腫瘍	【胚細胞】BEP療法	21	シスプラチン点滴静注(10、25、50mg)	20	mg/m ²																						
			ブレオ注 15mg	20	mg/m ²																						
			＜新＞メトトレキサート注(5mg、50mg)	0.4	mg/Kg																						
			ノリタセ点点滴静注液「サイ」(40mg、100mg)	80	mg/m ²																						
			シスプラチン点滴静注(10、25、50mg)	60	mg/m ²																						
絨毛がん	【絨毛】IMTX単剤療法	14	シスプラチン点滴静注(10、25、50mg)	60	mg/m ²																						
子宮頸がん	CPT-11／CDDP療法	28	ドキシル点点滴静注(10、50mg)	60	mg/m ²																						
子宮体がん	AP療法	21	シスプラチン点滴静注(10、25、50mg)	60	mg/m ²																						
子宮頸がん	【頸】CDDP/NGT療法	21	ハイカムチン注射用 1.1mg	0.75	mg/m ²																						
子宮頸がん	シスプラチン点滴静注(10、25、50mg)	50	mg/m ²																								
子宮頸がん	Chemo+Radl	6	シスプラチン点滴静注(10、25、50mg)	40	mg/m ²																						
子宮頸がん	Weekly PTX(Day1,8,15)	28	(薬)ノリタセ点点滴静注液「ホステーラ」(30、100mg)	80	mg/m ²																						
子宮頸がん	【子宮頸】TC療法(AUC5)	21	カルボフラジニ注「サト」(50、150mg、450mg)	5	(AUC)																						
子宮頸がん	【頸】TP+Bev療法(1コース目)	21	(薬)ノリタセ点点滴静注液「ホステーラ」(30、100mg)	175	mg/m ²																						
			シスプラチン点滴静注(10、25、50mg)	50	mg/m ²																						
			アバシマブBS点滴静注(100、400mg)	15	mg/Kg																						
			(薬)ノリタセ点点滴静注液「ホステーラ」(30、100mg)	175	mg/m ²																						
			シスプラチン点滴静注(10、25、50mg)	50	mg/m ²																						
子宮頸がん	【頸】TP+Bev療法(2コース目)	21	アバシマブ点滴静注用(100、400mg)	15	mg/Kg																						
子宮頸がん	【頸】TP+Bev療法(3コース目以降)	21	アバシマブ点滴静注用(100、400mg)	15	mg/Kg																						
子宮頸がん	Docetaxel単剤(3週毎)	21	(薬)ノリタセ点点滴静注液「ホステーラ」(30、100mg)	175	mg/m ²																						
子宮頸がん	DC療法(頸)	21	ドセタキセル点点滴静注「プロ」(20、80mg)	60	mg/m ²																						
子宮体がん	【子宮体】DP療法	21	カルボフラジニ注「サト」(50、150mg、450mg)	0	mg																						
子宮体がん	【子宮体】DP療法	21	ドセタキセル点点滴静注「プロ」(20、80mg)	70	mg/m ²																						
卵巣がん	【卵巣】NGT(1.25mg/m ²) + Bev(13コース目)	21	シスプラチン点滴静注(10、25、50mg)	60	mg/m ²																						
卵巣がん	【卵巣】NGT(1.25mg/m ²) + Bev(23コース目)	21	ハイカムチン注射用 1.1mg	1.25	mg/m ²																						
卵巣がん	【卵巣】NGT(1.25mg/m ²) + Bev(33コース以降)	21	ペバシズマブBS点滴静注(100、400mg)「第一三共」	15	mg/Kg																						
卵巣がん	【卵巣】NGT(1.25mg/m ²) + Bev(33コース以降)	21	ハイカムチン注射用 1.1mg	1.25	mg/m ²																						
卵巣がん	【卵巣】NGT(1.25mg/m ²) + Bev(33コース以降)	21	ペバシズマブBS点滴静注(100、400mg)「第一三共」	15	mg/Kg																						
卵巣がん	【卵巣】NGT(1.25mg/m ²) + Bev(33コース以降)	21	ハイカムチン注射用 1.1mg	1.25	mg/m ²																						
卵巣がん	【卵巣】NGT(1.25mg/m ²) + Bev(33コース以降)	21	ペバシズマブBS点滴静注(100、400mg)「第一三共」	15	mg/Kg																						
卵巣がん	【卵巣】NGT(1.25mg/m ²) + Bev(33コース以降)	21	ハイカムチン注射用 1.1mg	1.25	mg/m ²																						
卵巣がん	【卵巣】NGT(1.25mg/m ²) + Bev(33コース以降)	21	ペバシズマブBS点滴静注(100、400mg)「第一三共」	15	mg/Kg																						
卵巣がん	【卵巣】NGT(1.25mg/m ²) + Bev(33コース以降)	21	ハイカムチン注射用 1.1mg	1.25	mg/m ²																						
卵巣がん	【卵巣】NGT(1.25mg/m ²) + Bev(33コース以降)	21	ペバシズマブBS点滴静注(100、400mg)「第一三共」	15	mg/Kg																						
卵巣がん	【卵巣】NGT(1.25mg/m ²) + Bev(33コース以降)	21	ハイカムチン注射用 1.1mg	1.25	mg/m ²																						
卵巣がん	【卵巣】NGT(1.25mg/m ²) + Bev(33コース以降)	21	ペバシズマブBS点滴静注(100、400mg)「第一三共」	15	mg/Kg																						
卵巣がん	【卵巣】NGT(1.25mg/m ²) + Bev(33コース以降)	21	ハイカムチン注射用 1.1mg	1.25	mg/m ²																						
卵巣がん	【卵巣】NGT(1.25mg/m ²) + Bev(33コース以降)	21	ペバシズマブBS点滴静注(100、400mg)「第一三共」	15	mg/Kg																						
卵巣がん	【卵巣】NGT(1.25mg/m ²) + Bev(33コース以降)	21	ハイカムチン注射用 1.1mg	1.25	mg/m ²																						
卵巣がん	【卵巣】NGT(1.25mg/m ²) + Bev(33コース以降)	21	ペバシズマブBS点滴静注(100、400mg)「第一三共」	15	mg/Kg																						
卵巣がん	【卵巣】NGT(1.25mg/m ²) + Bev(33コース以降)	21	ハイカムチン注射用 1.1mg	1.25	mg/m ²																						
卵巣がん	【卵巣】NGT(1.25mg/m ²) + Bev(33コース以降)	21	ペバシズマブBS点滴静注(100、400mg)「第一三共」	15	mg/Kg																						
卵巣がん	【卵巣】NGT(1.25mg/m ²) + Bev(33コース以降)	21	ハイカムチン注射用 1.1mg	1.25	mg/m ²																						
卵巣がん	【卵巣】NGT(1.25mg/m ²) + Bev(33コース以降)	21	ペバシズマブBS点滴静注(100、400mg)「第一三共」	15	mg/Kg																						
卵巣がん	【卵巣】NGT(1.25mg/m ²) + Bev(33コース以降)	21	ハイカムチン注射用 1.1mg	1.25	mg/m ²																						
卵巣がん	【卵巣】NGT(1.25mg/m ²) + Bev(33コース以降)	21	ペバシズマブBS点滴静注(100、400mg)「第一三共」	15	mg/Kg																						
卵巣がん	【卵巣】NGT(1.25mg/m ²) + Bev(33コース以降)	21	ハイカムチン注射用 1.1mg	1.25	mg/m ²																						
卵巣がん	【卵巣】NGT(1.25mg/m ²) + Bev(33コース以降)	21	ペバシズマブBS点滴静注(100、400mg)「第一三共」	15	mg/Kg																						
卵巣がん	【卵巣】NGT(1.25mg/m ²) + Bev(33コース以降)	21	ハイカムチン注射用 1.1mg	1.25	mg/m ²																						
卵巣がん	【卵巣】NGT(1.25mg/m ²) + Bev(33コース以降)	21	ペバシズマブBS点滴静注(100、400mg)「第一三共」	15	mg/Kg																						
卵巣がん	【卵巣】NGT(1.25mg/m ²) + Bev(33コース以降)	21	ハイカムチン注射用 1.1mg	1.25	mg/m ²																						
卵巣がん	【卵巣】NGT(1.25mg/m ²) + Bev(33コース以降)	21	ペバシズマブBS点滴静注(100、400mg)「第一三共」	15	mg/Kg																						
卵巣がん	【卵巣】NGT(1.25mg/m ²) + Bev(33コース以降)	21	ハイカムチン注射用 1.1mg	1.25	mg/m ²																						
卵巣がん	【卵巣】NGT(1.25mg/m ²) + Bev(33コース以降)	21	ペバシズマブBS点滴静注(100、400mg)「第一三共」	15	mg/Kg																						
卵巣がん	【卵巣】NGT(1.25mg/m ²) + Bev(33コース以降)	21	ハイカムチン注射用 1.1mg	1.25	mg/m ²																						
卵巣がん	【卵巣】NGT(1.25mg/m ²) + Bev(33コース以降)	21	ペバシズマブBS点滴静注(100、400mg)「第一三共」	15	mg/Kg																						
卵巣がん	【卵巣】NGT(1.25mg/m ²) + Bev(33コース以降)	21	ハイカムチン注射用 1.1mg	1.25	mg/m ²																						
卵巣がん	【卵巣】NGT(1.25mg/m ²) + Bev(33コース以降)	21	ペバシズマブBS点滴静注(100、400mg)「第一三共」	15	mg/Kg																						
卵巣がん	【卵巣】NGT(1.25mg/m ²) + Bev(33コース以降)	21	ハイカムチン注射用 1.1mg	1.25	mg/m ²																						
卵巣がん	【卵巣】NGT(1.25mg/m ²) + Bev(33コース以降)	21	ペバシズマブBS点滴静注(100、400mg)「第一三共」	15	mg/Kg																						
卵巣がん	【卵巣】NGT(1.25mg/m ²) + Bev(33コース以降)	21	ハイカムチン注射用 1.1mg	1.25	mg/m ²																						
卵巣がん	【卵巣】NGT(1.25mg/m ²) + Bev(33コース以降)	21	ペバシズマブBS点滴静注(100、400mg)「第一三共」	15	mg/Kg																						
卵巣がん	【卵巣】NGT(1.25mg/m ²) + Bev(33コース以降)	21	ハイカムチン注射用 1.1mg	1.25	mg/m ²																						
卵巣がん	【卵巣】NGT(1.25mg/m ²) + Bev(33コース以降)	21	ペバシズマブBS点滴静注(100、400mg)「第一三共」	15	mg/Kg																						
卵巣がん	【卵巣】NGT(1.25mg/m ²) + Bev(33コース以降)	21	ハイカムチン注射用 1.1mg	1.25	mg/m ²																						

疾患名	レジメン名称	インターバル日数	薬剤名称	標準値(1回量)	単位	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5	Day 6	Day 7	Day 8	Day 9	Day 10	Day 11	Day 12	Day 13	Day 14	Day 15	Day 16	Day 17	Day 18	Day 19	Day 20	Day 21	Day 22
子宮頸がん	【頭】CCRT(急速利尿)	7	アバスタン点滴静注(10、25、50mg)	40	mg/m ²	○																					
子宮頸がん	【頭】Pembro(3週)+Bev維持療法	21	キイトルーダ点滴静注 100mg 4ml アバスタン点滴静注用(100、400mg)	200 15	mg mg/Kg	○ ○																					
子宮頸がん	【頭】Pembro維持療法(3週)	21	キイトルーダ点滴静注 100mg 4ml	200	mg	○																					
子宮頸がん	【頭】Pembro維持療法(6週)	21	キイトルーダ点滴静注 100mg 4ml	400	mg	○																					
子宮頸がん	【頭】Bev維持療法	21	アバスタン点滴静注用(100、400mg)	15	mg/Kg	○																					
子宮頸がん	【頭】Pembro(6週)+Bev維持療法	42	キイトルーダ点滴静注 100mg 4ml アバスタン点滴静注用(100、400mg)	400 15	mg mg/Kg	○ ○																					○
子宮頸がん	【頭】TP+Pembro療法	21	キイトルーダ点滴静注 100mg 4ml (薬)ハクワセル点滴静注液「ホステラ」(30、100mg) シスプラチン点滴静注(10、25、50mg)	200 175 50	mg mg/m ² mg/m ²	○ ○ ○																					
子宮頸がん	【頭】TC+Bev療法(1コース目)	21	アバスタン点滴静注用(100、400mg) カルボフラジニ「サント」(50、150mg、450mg)	15 5	mg/Kg (AUC)	○ ○																					
子宮頸がん	【頭】TC+Bev療法(2コース目)	21	(薬)ハクワセル点滴静注液「ホステラ」(30、100mg) アバスタン点滴静注用(100、400mg)	175 5	mg/m ² (AUC)	○ ○																					
子宮頸がん	【頭】TC+Bev療法(3コース目以降)	21	カルボフラジニ「サント」(50、150mg、450mg) アバスタン点滴静注用(100、400mg)	175 5	mg/Kg (AUC)	○ ○																					
子宮頸がん	【頭】TC+pembro療法	21	(薬)ハクワセル点滴静注液「ホステラ」(30、100mg) キイトルーダ点滴静注 100mg 4ml	175 200	mg/m ² mg	○ ○																					
子宮頸がん	【頭】TP+Pembro+Bev療法(1コース目)	21	(薬)ハクワセル点滴静注液「ホステラ」(30、100mg) シスプラチン点滴静注(10、25、50mg) アバスタン点滴静注用(100、400mg)	175 50 15	mg/m ² mg/m ² mg/Kg	○ ○ ○																					
子宮頸がん	【頭】TP+pembro+Bev療法(1コース目)	21	キイトルーダ点滴静注 100mg 4ml カルボフラジニ「サント」(50、150mg、450mg)	200 5	mg (AUC)	○ ○																					
子宮頸がん	【頭】TP+Pembro+Bev療法(2コース目)	21	アバスタン点滴静注用(100、400mg) (薬)ハクワセル点滴静注液「ホステラ」(30、100mg) キイトルーダ点滴静注 100mg 4ml	15 200 175	mg/Kg mg/m ² mg/m ²	○ ○ ○																					
子宮頸がん	【頭】TP+pembro+Bev療法(2コース目)	21	シスプラチン点滴静注(10、25、50mg) アバスタン点滴静注用(100、400mg) カルボフラジニ「サント」(50、150mg、450mg)	50 15 5	mg/m ² mg/Kg (AUC)	○ ○ ○																					
子宮頸がん	【頭】TC+pembro+Bev療法(2コース目)	21	アバスタン点滴静注用(100、400mg) キイトルーダ点滴静注 100mg 4ml	15 200	mg/Kg mg	○ ○																					
子宮頸がん	【頭】TC+pembro+BEV療法(3コース目以降)	21	(薬)ハクワセル点滴静注液「ホステラ」(30、100mg) (薬)ハクワセル点滴静注液「ホステラ」(30、100mg) カルボフラジニ「サント」(50、150mg、450mg)	175 175 5	mg/m ² mg/m ² (AUC)	○ ○ ○																					
子宮頸がん	【頭】TP+Pembro+Bev療法(3コース目以降)	21	アバスタン点滴静注用(100、400mg) キイトルーダ点滴静注 100mg 4ml キイトルーダ点滴静注 100mg 4ml	15 200 200	mg/Kg mg mg	○ ○ ○																					
子宮頸がん	【頭】TP+pembro+Bev療法(3コース目以降)	21	(薬)ハクワセル点滴静注液「ホステラ」(30、100mg) シスプラチン点滴静注(10、25、50mg) アバスタン点滴静注用(100、400mg)	175 50 15	mg/m ² mg/m ² mg/Kg	○ ○ ○																					
子宮頸がん	【頭】tT/MVP(リブP3)	21	リブタヨ点滴静注 350mg 7ml	350	mg	○																					
子宮体がん	【子宮体】hEム「ロズマ」(3週)+hEハチニブ	21	キイトルーダ点滴静注 100mg 4ml	200	mg	○																					
卵巣がん	ドキシル(90mg未満)+CBDCA	28	レンデマカブセル 10mg ドキシレル注 20mg 10ml	30 20	mg mg/m ²	○ ○																					
卵巣がん	【卵巣癌】hEナシスBev療法(7コース目以降)	21	カルボフラジニ「サント」(50、150mg、450mg) ペバシスマブBS点滴静注(100、400mg)【第一〜三共】	5 15	(AUC) mg/Kg	○ ○																					
卵巣がん	【卵巣癌】TC+Bev療法(1コース目)AUC6	21	(薬)ハクワセル点滴静注液「ホステラ」(30、100mg) カルボフラジニ「サント」(50、150mg、450mg)	175 6	mg/m ² (AUC)	○ ○																					
卵巣がん	【卵巣癌】TC+Bev療法(2コース目)AUC6	21	ペバシスマブBS点滴静注(100、400mg)【第一〜三共】 (薬)ハクワセル点滴静注液「ホステラ」(30、100mg)	15 175	mg/Kg mg/m ²	○ ○																					
卵巣がん	【卵巣癌】TC+Bev療法(3コース目以降)AUC6	21	カルボフラジニ「サント」(50、150mg、450mg) ペバシスマブBS点滴静注(100、400mg)【第一〜三共】 (薬)ハクワセル点滴静注液「ホステラ」(30、100mg)	6 15 175	(AUC) mg/Kg mg/m ²	○ ○ ○																					
卵巣がん	【卵巣癌】TC+Bev療法(3コース目以降)AUC6	21	シスプラチン点滴静注(10、25、50mg) カルボフラジニ「サント」(50、150mg、450mg) ペバシスマブBS点滴静注(100、400mg)【第一〜三共】	175 6 15	mg/m ² (AUC) mg/Kg	○ ○ ○																					
絨毛がん	【絨毛】EMA-CO	14	エトボシド点滴静注液100mg(サント) 5ml 【新1】メントレキセート注(5mg、50mg) コスメゲン注 0.5mg 【新1】メントレキセート注(5mg、50mg) エントキサン注(100、500mg)	100 100 0.5 200 600	mg/m ² mg/m ² mg mg/m ² mg/m ²	○ ○ ○ ○ ○	○																				
絨毛がん	【絨毛】EMA-CO	14	エントキサン注(100、500mg) ドンモン注 1mg シスプラチン点滴静注(10、25、50mg) ブレオ注 15mg	1 1 20 30	mg/m ² mg/m ² mg mg	○ ○ ○ ○	○	○	○	○	○																
胚細胞腫瘍	【胚細胞】BEP療法	21	エトボシド点滴静注液100mg(サント) 5ml	100	mg/m ²	○	○	○	○	○	○																